

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **TACARDIA® D** **LOSARTAN POTÁSICO 50 mg** **HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 mg** **Comprimidos recubiertos**

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

#### **Cada comprimido recubierto contiene:**

Losartan potásico..... 50 mg  
Hidroclorotiazida..... 12,5 mg  
Excipientes: Celulosa microcristalina PH200, Lactosa monohidrato, Almidón de maíz pregelatinizado 1500, Croscarmelosa sódica, Crospovidona, Estearato de magnesio, Opadry YS – 1 – 7003 (Dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol, polisorbato 80), DYC Yellow #10, Agua ..... c.s.

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.  
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.  
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **1. ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE DEBERÍA SABER DE TACARDIA D®?**

· Tacardía D® puede causarle un daño o la muerte a su bebé nonato.  
· Consulte a su médico acerca de otras formas de reducir su presión sanguínea si planea quedar embarazada.  
· Si queda embarazada mientras está tomando Tacardía D®, avise a su médico inmediatamente.

#### **2. ¿QUÉ ES TACARDIA D®?**

Tacardía D® contiene dos medicamentos de venta bajo receta, un inhibidor al receptor de angiotensina y un diurético.

#### **Tacardía D® es utilizado para:**

· Reducir la presión sanguínea elevada (hipertensión). Tacardía D® no suele ser la primera medicación usada para el tratamiento de la presión sanguínea elevada.  
· Reducir el riesgo de infarto en pacientes con presión sanguínea elevada y un problema cardíaco conocido como hipertrofia ventricular izquierda.

No se ha estudiado el uso de Tacardía D® en niños menores de 18 años de edad.

**Presión sanguínea elevada (hipertensión):** La presión sanguínea es la fuerza en sus vasos sanguíneos cuando late su corazón y cuando su corazón descansa. Ud. puede tener presión sanguínea elevada cuando la fuerza es demasiada. El losartan potásico presente en Tacardía D® puede ayudar a relajar los vasos sanguíneos y así disminuir su presión sanguínea. La hidroclorotiazida presente en Tacardía D® hace que sus riñones filtren más agua y sal.

**Hipertrofia ventricular izquierda:** Es un ensanchamiento de las paredes de la cámara izquierda del corazón (la cámara principal para el bombeo cardíaco). La hipertrofia ventricular izquierda puede ocurrir por múltiples causas. La presión sanguínea elevada es la mayor causa de hipertrofia ventricular izquierda.

#### **3. ¿QUIÉNES NO DEBEN TOMAR TACARDIA D®?**

No debe tomar Tacardía D® si usted:  
· Es alérgico a Tacardía D® o a cualquier ingrediente en su composición.  
· No puede orinar  
· Tiene diabetes en tratamiento con un medicamento para disminuir la presión arterial conteniendo aliskiren.

#### **4. ¿QUÉ NECESITA SABER MI MÉDICO ANTES DE EMPEZAR A TOMAR TACARDIA D®?**

Avise a su médico de todas sus condiciones médicas, especialmente si Ud.:  
· Se encuentra embarazada o planea estarlo.  
· Se encuentra dando de amamantar o planea hacerlo. Tacardía D® puede pasar a la leche materna y dañar a su bebé. Usted y su médico deberán decidir si toma Tacardía D® o dé de amamantar a su bebé. No debe hacer ambas a la vez.  
· Ha estado vomitando, teniendo diarrea, sudoración profusa o no ha estado tomando suficientes líquidos. Esto podría causarle presión baja.  
· Tiene problemas hepáticos  
· Tiene problemas renales  
· Tiene lupus eritematoso sistémico (LES)  
· Tiene diabetes  
· Tiene gota  
· Tiene alguna alergia

Dé aviso a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de venta bajo receta, medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

Tacardía D® y algunos otros medicamentos pueden interactuar entre sí. Avise a su médico especialmente si usted toma:

· Suplementos de potasio  
· Sustitutos de la sal que contengan potasio  
· Diuréticos  
· Litio (un medicamento para el tratamiento de un cierto tipo de depresión)  
· Medicamentos para el tratamiento del dolor y la artritis, llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo inhibidores de COX-2  
· Otros medicamentos para reducir la presión sanguínea

Conozca los medicamentos que toma. Conserve un listado de sus medicamentos y muéstreselo a su médico cuando le sea prescripto un nuevo medicamento.

#### **5. ¿CÓMO TOMAR TACARDIA D®?**

· Tome Tacardía D® exactamente como lo hubiera indicado su médico. Su médico podrá cambiarle la dosis de ser necesario.  
· Se puede tomar Tacardía D® con o sin las comidas.  
· Si se saltea una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. De ser un horario cercano a su próxima dosis, no tome la dosis faltante. Simplemente tome la siguiente dosis en el horario regular.

· Si toma demasiado Tacardía D®, llame a su médico o centro de intoxicaciones, o acuda a la guardia clínica más cercana inmediatamente.  
· Su médico podrá realizarle pruebas de laboratorio regularmente mientras se encuentre bajo tratamiento con Tacardía D®.

#### **6. ¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DE TACARDIA D®? Tacardía D® puede causar los siguientes efectos adversos serios:**

· Daño o muerte en bebés nonatos.  
· Reacción alérgica. Los síntomas de la reacción alérgica son inflamación del rostro, labios, garganta o lengua. Deberá recibir asistencia médica de inmediato y dejar de tomar Tacardía D®.  
· Presión sanguínea baja (hipotensión). La presión sanguínea baja puede hacer que se sienta débil o mareado. Recuéstese si se siente débil o mareado. Llame a su médico inmediatamente.  
· Si tiene problemas renales, Ud. podrá ver un empeoramiento en qué tan bien trabajan sus riñones. Llame a su médico si sus pies, tobillos o manos se inflaman, o por ganancia de peso sin causa aparente.  
· Una condición nueva o que desmejora llamada lupus eritematoso sistémico (LES).  
· Problemas oculares. Uno de los medicamentos presentes en Tacardía D® puede causar problemas oculares que, de no ser tratados, pueden llevar a pérdida en la visión. Los síntomas de los problemas oculares pueden ocurrir dentro de pocas horas hasta semanas desde el tratamiento con Tacardía D®. Avise a su médico inmediatamente si tiene:

· Visión disminuida

· Dolor ocular

#### **Los efectos adversos más comunes de Tacardía D® en personas con presión sanguínea elevada son:**

· Resfriós (infección respiratoria alta)

· Mareos

· Congestión nasal

· Dolor de espalda

#### **7. PRESENTACIÓN**

Envases conteniendo 28, 30, 56, 250, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, los tres últimos para uso hospitalario exclusivo.

#### **8. CONSERVACIÓN**

Conservar en su envase original a una temperatura entre 15°C y 30°C.

*"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No se lo recomiende a otras personas."*

#### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Acción Social. Certificado Nº 50.110

*"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"*

"Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica."

Laboratorios RICHMOND S.A.C.I.F.,  
Calle 3 N° 519 Parque Industrial Pilar, Provincia de Buenos Aires.  
Director Técnico: Pablo Da Pos – Farmacéutico.

Fecha de revisión última: 11/05/2018



041774-03